



## **Скашивание – один из методов борьбы с борщевиком Сосновского**



**Борщевик Сосновского** – многолетнее травянистое растение, срок жизни которого может достигать до 12 лет. Однако продолжительность его жизни ограничена фазой цветения. Цветет борщевик Сосновского один раз в жизни, после чего отмирает. Сок борщевика опасен для человека и животных в период цветения и

образования семян. Особенно вреден борщевик в период цветения, в жару, когда с листьев активно испаряются эфирные масла.

В современных условиях для снижения вредоносности борщевика Сосновского особое значение приобретает комплекс защитных мероприятий. Одним из таких мероприятий является скашивание.

Скашивание является эффективным способом уничтожения борщевиков только при условии, что будет проводиться перед выходом растений «в трубку», т.е. обязательно перед цветением борщевиков. Каждое следующее скашивание проводится через 3-4 недели после предыдущего. Этот приём нужен для уничтожения всех генеративных побегов борщевика, несущих соцветия, и, соответственно, цветки. Важно не давать борщевикам цвести, чтобы не образовались новые семена. А если скашивать борщевики только один раз в середине цветения – это лишь будет способствовать дальнейшему размножению растений.

Этот метод можно применять на землях любых категорий.

На территориях отводов автодорог (где возможно применение техники), проводят скашивание и срезание бульдозерами вегетативной массы борщевика.

На территориях сельскохозяйственных предприятий и муниципальных образований (где возможно применение с/х техники), проводят вспашку и дискование для полного уничтожения вегетирующих растений борщевика.

По всем интересующим вопросам борьбы с борщевиком Сосновского можно обратиться в филиал ФГБУ «Россельхозцентра» по Архангельской области по адресу г. Архангельск, пр. Ломоносова, 206, офис 908 или по телефону 8 (8182) 65-33-84, а также в районные отделы.